В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ребром 2 точка M является серединой отрезка $A_1 C_1$:

а) Постройте сечение куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через прямую BM параллельно прямой AB_1 ;

б) Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BM .

а) Плоскость, проходящая через прямую BM параллельно прямой AB_1 , пересекает плоскость грани $AA_1 B_1 B$ по прямой, параллельной прямой AB_1 , и т.к. точка $B \in (AA_1 B_1 B)$, то эта прямая проходит через точку B . Проводим через точку B прямую, параллельную AB_1 , которая пересечёт продолжение ребра $A_1 B_1$ в точке E , которая принадлежит плоскостям граней $AA_1 B_1 B$, $A_1 B_1 C_1 D_1$ и плоскости сечения.

Точки E и M принадлежат плоскости сечения и плоскости грани $A_1 B_1 C_1 D_1$, значит, эти плоскости пересекаются по прямой, проходящей через точки E и M , которая пересекает рёбра $B_1 C_1$ и $A_1 D_1$ в точках F и H соответственно.

Точки F и B принадлежат плоскости сечения и плоскости грани $BB_1 C_1 C$, значит, эти плоскости пересекаются по прямой FB .

Грани $BB_1 C_1 C$ и $AA_1 D_1 D$ параллельны, поэтому плоскость сечения пересекает их по параллельным прямым. Через точку H проводим $HK \parallel FB$. Соединим точки B и K . Сечение $BFHK$ построено. Отметим, что $FH \parallel BK$, т.к. грани $ABCD$ и $A_1 B_1 C_1 D_1$ параллельны.

б) Проще всего расстояние между прямыми AB_1 и BM найти как расстояние между плоскостью сечения и параллельной ей плоскостью, проходящей через AB_1 . Построим эту плоскость. Т.к. искомая плоскость параллельна сечению, то она пересекает плоскости граней $ABCD$ и $A_1 B_1 C_1 D_1$ по прямым, параллельным FH и BK и проходит через точки A и B_1 . Проводим $B_1 J \parallel FH$ и $AL \parallel KB$ (L – точка пересечения продолжения ребра CB и прямой проходящей через точку A).

$AJB_1 L \parallel KHFB$ по построению, $JB_1 FH \parallel ALBK$ т.к. $ABCD \parallel A_1 B_1 C_1 D_1$ и $AJHK \parallel LB_1 FB$ т.к. $AA_1 D_1 D \parallel BB_1 C_1 C$, т.е. $ALBKJB_1 FH$ – параллелепипед. Если считать $ALBK$ и $JB_1 FH$ основаниями этого параллелепипеда, то его высота равна ребру куба (например, AA_1). Т.к. $AB \perp BC$, то AB – высота параллелограмма $ALBK$, и объём параллелепипеда $ALBKJB_1 FH$

$$V = AK \cdot AB \cdot AA_1 = 4AK.$$

Найдём AK . Отметим, что $AK = LB = B_1 F = JH$. $AB \parallel B_1 E$ и $AB_1 \parallel BE \Rightarrow ABEB_1$ – параллелограмм, и $B_1 E = AB$, но $AB = A_1 B_1$, поэтому $B_1 E = A_1 B_1$. $B_1 F \parallel A_1 H$, значит,

$B_1 F$ – средняя линия треугольника $A_1 EH$: $B_1 F = \frac{1}{2} A_1 H \Leftrightarrow A_1 H = 2B_1 F$.

$\Delta A_1 M H = \Delta C_1 M F$ по 2-му признаку равенства треугольников: $A M = M C_1$, т.к. по условию M – середина $A_1 C_1$, $\angle A_1 M H = \angle C_1 M F$ (вертикальные) и $\angle M A_1 H = \angle M C_1 F$

(накрест лежащие при параллельных A_1D_1 и B_1C_1 и секущей A_1C_1), поэтому $FC_1 = A_1H = 2B_1F$.

$$B_1C_1 = B_1F + FC_1 = 3FC_1 \Rightarrow FC_1 = \frac{1}{3}B_1C_1 = \frac{2}{3} \Rightarrow AK = \frac{2}{3}, FC_1 = \frac{4}{3} \text{ и } V = \frac{8}{3}.$$

Если теперь считать основанием параллелепипеда $ALBKJB_1FH$ параллелограмм AJB_1L , то его высота будет равна расстоянию от плоскости AJB_1L до плоскости сечения, а значит, и расстоянию между прямыми AB_1 и BM . Поделив объём параллелепипеда $ALBKJB_1FH$ на площадь параллелограмма AJB_1L , найдём это расстояние.

Итак, ищем площадь AJB_1L .

$JB_1 \parallel HE$ по построению, значит, JB_1 – средняя линия треугольника A_1EH : $A_1J = \frac{1}{2}A_1H$, но $A_1H = FC_1 = \frac{4}{3} \Rightarrow A_1J = \frac{2}{3}$. По

теореме Пифагора

$$JB_1^2 = JA_1^2 + A_1B_1^2 = \frac{4}{9} + 4 = \frac{40}{9} \Rightarrow JB_1 = \frac{2\sqrt{10}}{3}. \text{ Анало-}$$

гично, $AJ = \frac{2\sqrt{10}}{3}$, т.е. AJB_1L – ромб, I – точка пере-

сечения его диагоналей. $AB_1 \perp JL$. AB_1 – диагональ

грани куба AA_1B_1B , поэтому $AB_1 = 2\sqrt{2}$.

$B_1I = \frac{1}{2}AB_1 = \sqrt{2}$. По теореме Пифагора

$$JI^2 + B_1I^2 = JB_1^2 \Leftrightarrow JI^2 + 2 = \frac{40}{9} \Leftrightarrow JI^2 = \frac{40}{9} - 2 = \frac{22}{9} \Rightarrow JI = \frac{\sqrt{22}}{3} = \frac{1}{2}JL.$$

$S_{AJB_1L} = \frac{1}{2}AB_1 \cdot JL = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{22}}{3} = \frac{4\sqrt{11}}{3}$. Расстоянию между прямыми AB_1 и BM :

$$d = \frac{8}{3} : \frac{4\sqrt{11}}{3} = \frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}.$$